

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	<p>MISURE TEMPORANEE DI PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS E DONAZIONE DI SANGUE</p> <p><i>DMTE della MACROAREA VARESE SIMT</i></p>	<p>Cod.:</p> <p>Data: 09/04/2021 Rev. 9 Pagina 1 di 2</p>
--	---	---

INFORMATIVA PER I DONATORI

(Revisione aggiornata alla Circolare Prot. n. 797 CNS 2020 del 26/03/2020 e successive integrazioni e modifiche Prot. n. 1447, 1656, 2103 CNS 2020 e 94 CNS 2021 e 130 CNS 2021)

Il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it contiene tutte le indicazioni e gli aggiornamenti utili e attuali sull'infezione da Nuovo Coronavirus, denominata SARS-CoV-2 o COVID-19.

Per quanto scientificamente noto la trasfusione non trasmette il contagio.

Le precauzioni sanitarie messe in atto nella popolazione generale per la prevenzione del contagio possono peraltro comportare un minor accesso di donatori volontari di sangue ed emocomponenti, col rischio di una riduzione della disponibilità di donazioni destinata alla trasfusione dei pazienti, mentre è necessario sostenere la donazione.

Si ricorda che, come sempre, si può donare solo se si è in buone condizioni di salute.

Il donatore deve sempre indossare correttamente la mascherina (almeno chirurgica)

Le controindicazioni o impedimenti alla donazione di sangue di particolare rilevanza per COVID-19 sono elencate di seguito.

In tutti i casi elencati il donatore non deve presentarsi al punto di raccolta.

NON SI PUO' DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione per 14 giorni nei seguenti casi:

- obbligo della misura di isolamento fiduciario domiciliare o quarantena
- rialzo febbrile ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) o comparsa di sintomi compatibili con infezione o comunque da malattia da raffreddamento o simil-influenzali

VIAGGI:

- rientro da viaggio o soggiorno da Paesi Esteri di cui agli elenchi D,E,F dell'ALL 20 del DPCM del 13/10/2020
- rientro da viaggio o soggiorno in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna se non sono state assolte le seguenti misure di obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi a mezzo tampone,

a) al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure

b) entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento, e in tal caso, in attesa di sottoporsi al test, l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

NB: Se rientri da un paese per cui è previsto il tampone obbligatorio potrai donare solo dopo che il tampone avrà dato esito negativo

- Spostamenti in ambito Nazionale: soggetti per i quali sia prevista l'applicazione del provvedimento di sanità pubblica consistente nell'isolamento fiduciario domiciliare e/o nella quarantena secondo le indicazioni previste nella Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020.

CONTATTI

- Anamnesi positiva per possibile esposizione al rischio di contagio per contatto stretto con soggetti con infezione confermata da SARS-CoV-2 (14 giorni dall'ultima esposizione in assenza di esecuzione del test oppure 10 giorni dall'ultima esposizione in caso di esito negativo al test antigenico o molecolare effettuato al decimo giorno)

NON SI PUO' DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione:

- Caso con tampone naso faringeo positivo, asintomatico: si può accettare alla donazione il donatore dopo almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, con esecuzione di test molecolare con esito negativo effettuato il decimo giorno **(10 giorni + test)**
- Caso con tampone naso faringeo positivo, sintomatici: si può accettare alla donazione il donatore dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia* e ageusia*/disgeusia* che possono avere prolungata persistenza nel tempo) con test molecolare con riscontro negativo effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi **(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).**



**MISURE TEMPORANEE DI PREVENZIONE
DELL'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS E
DONAZIONE DI SANGUE**

**DMTE della MACROAREA VARESE
SIMT**

Cod.: ,

Data: 09/04/2021

Rev. 9

Pagina 2 di 2

- Caso con tampone nasofaringeo positivo a lungo termine (come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020): si può accettare alla donazione il donatore **dopo risoluzione completa dei sintomi da almeno 14 giorni** (e non prima di 28 giorni dalla comparsa dei sintomi)

*anosmia: perdita dell'olfatto *ageusia: perdita del gusto *disgeusia: alterazione del gusto

NOTA: i donatori di sangue che sono vaccinati con gli attuali vaccini anti COVID-19 possono essere accettati per la donazione di sangue ed emocomponenti 48 ore dopo ciascun episodio vaccinale, fatto salvo che non abbiano sviluppato sintomi dopo la somministrazione del vaccino. (Rif. Prot. n. 0336.CNS.2021 25.02.2021)

ACCOGLIENZA DEL DONATORE

Presso le sedi di Raccolta, prima dell'ingresso nell'area di attesa, il Donatore sarà accolto e sottoposto a semplice triage iniziale, quale misura di "smistamento" e di ulteriore "filtro" in fase di presentazione. In tale fase, verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea con apposito dispositivo.

INFORMAZIONE POST DONAZIONE

Il donatore deve informare il Servizio Trasfusionale di riferimento se nei **14 giorni successivi alla donazione**

- è risultato positivo per infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo)
- ha insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi compatibili con SARS-CoV-2 (per esempio febbre, tosse o difficoltà respiratoria)
- ha avuto un contatto stretto, nei due giorni precedenti la donazione, con un soggetto cui solo successivamente è stata posta diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo).

Il numero telefonico di riferimento è il seguente:

DEFINIZIONI MINISTERIALI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in un paese/area in cui è segnalata trasmissione locale
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Aver avuto un contatto fisico diretto o contatto diretto non protetto con le secrezioni o essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.