 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	<p>MISURE TEMPORANEE DI PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS E DONAZIONE DI SANGUE</p> <p><i>DMTE della MACROAREA VARESE SIMT</i></p>	<p>Cod.: TAB03PrS08SIMT</p> <p>Data: 14/03/2022 Rev. 11 Pagina 1 di 3</p>
--	---	---

INFORMATIVA PER I DONATORI

(Revisione aggiornata alla Circolare 60136 Ministero della salute del 30/12/2021 e Circolare 9498 Ministero della salute del 04/02/2022 e Circolare CNS 756 del 11-01-2022 e sito del CNS

<https://www.centronazionale sangue.it/covid-19/>

Il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it contiene tutte le indicazioni e gli aggiornamenti utili e attuali sull'infezione da Nuovo Coronavirus, denominata SARS-CoV-2 o COVID-19.

Per quanto scientificamente noto la trasfusione non trasmette il contagio.

Le precauzioni sanitarie messe in atto nella popolazione generale per la prevenzione del contagio possono peraltro comportare un minor accesso di donatori volontari di sangue ed emocomponenti, col rischio di una riduzione della disponibilità di donazioni destinata alla trasfusione dei pazienti, mentre è necessario sostenere la donazione.

ACCOGLIENZA DEL DONATORE

Presso le sedi di Raccolta, prima dell'ingresso nell'area di attesa, il Donatore sarà accolto e sottoposto a semplice triage iniziale, quale misura di "smistamento" e di ulteriore "filtro" in fase di presentazione. In tale fase, verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea con apposito dispositivo. L'accesso non è subordinato al possesso della certificazione verde.

Si ricorda che, come sempre, si può donare solo se si è in buone condizioni di salute.

Il donatore deve sempre indossare correttamente la mascherina (almeno chirurgica)

Le controindicazioni o impedimenti alla donazione di sangue di particolare rilevanza per COVID-19 sono elencate di seguito.


In tutti i casi elencati il donatore non deve presentarsi al punto di raccolta.

NON SI PUO' DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione per 10/14 giorni nei seguenti casi:

- obbligo della misura di isolamento fiduciario domiciliare o quarantena
- rialzo febbrile ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) o comparsa di sintomi compatibili con infezione o comunque da malattia da raffreddamento o simil-influenzali
- viaggi o soggiorni in aree per le quali sia prevista l'applicazione del provvedimento di isolamento fiduciario domiciliare o quarantena (Vedi Ministero della Salute Covid-19 – Viaggiatori)

IN CASO DI RISCONTRO DI TAMPONE POSITIVO NON SI PUO' DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione secondo quanto indicato nella tabella allegata

Situazione Clinica Donatore	Stato Vaccinale Donatore	Durata isolamento/quarantena e riammissione
ASINTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> • vaccinato con 3 dosi • o vaccinato con 2 dosi da meno di 120 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 giorni di isolamento • e al termine tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo
ASINTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> • non vaccinato • o vaccinato con 2 dosi da oltre 120 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 giorni di isolamento • e al termine tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo
SINTOMATICO		<ul style="list-style-type: none"> • 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi • e al termine tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	<p>MISURE TEMPORANEE DI PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS E DONAZIONE DI SANGUE</p> <p><i>DMTE della MACROAREA VARESE SIMT</i></p>	<p>Cod.: TAB03PrS08SIMT</p> <p>Data: 14/03/2022 Rev. 11 Pagina 2 di 3</p>
---	---	---

CONTATTI : In caso di Anamnesi positiva per possibile esposizione al rischio di contagio per contatto stretto con soggetti con infezione confermata da SARS-CoV-2 NON SI PUO' DONARE e si applica la sospensione temporanea dalla donazione secondo quanto indicato nella tabella allegata.

Situazione Clinica Donatore	Stato Vaccinale Donatore	Durata isolamento/quarantena e riammissione
ASINTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> vaccinato con 3 dosi o vaccinato con 2 dosi da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo completamento ciclo primario 	<ul style="list-style-type: none"> nessuna quarantena e <u>5 giorni</u> di autosorveglianza <u>10 giorni</u> con obbligo di mascherina FFP2
ASINTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> vaccinato con 2 dosi da oltre 4 mesi o guariti da più di 120 giorni senza dose di richiamo 	<ul style="list-style-type: none"> 5 giorni di quarantena dall'ultimo contatto e al termine tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo e successivi <u>5 giorni</u> con obbligo di mascherina FFP2
ASINTOMATICO	<ul style="list-style-type: none"> non vaccinato o vaccinato con una sola dose o vaccinato con 2 dosi da meno di 14 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> 10 giorni di quarantena e al termine tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo

ED INOLTRE:


- Caso con tampone nasofaringeo positivo a lungo termine (come da Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020): **si può accettare alla donazione il donatore dopo risoluzione completa dei sintomi da almeno 14 giorni** (e non prima di 28 giorni dalla comparsa dei sintomi) (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione)
- In caso di tampone nasale/nasofaringeo positivo eseguito al di fuori dei canali sanitari (autosomministrazione) si applica quanto indicato al punto precedente: **si può accettare alla donazione il donatore dopo risoluzione completa dei sintomi da almeno 14 giorni**

INFORMAZIONE POST DONAZIONE

Il donatore deve informare il Servizio Trasfusionale di riferimento se nei **7 giorni successivi alla donazione**

- è risultato positivo per infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo)
- ha insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi compatibili con SARS-CoV-2 (per esempio febbre, tosse o difficoltà respiratoria)
- ha avuto un contatto stretto, nei due giorni precedenti la donazione, con un soggetto cui solo successivamente è stata posta diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone positivo).

Il numero telefonico di riferimento è il seguente:

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	MISURE TEMPORANEE DI PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS E DONAZIONE DI SANGUE <i>DMTE della MACROAREA VARESE</i> SIMT	Cod.: TAB03PrS08SIMT Data: 14/03/2022 Rev. 11 Pagina 3 di 3
--	--	--

DEFINIZIONI MINISTERIALI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in un paese/area in cui è segnalata trasmissione locale
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Aver avuto un contatto fisico diretto o contatto diretto non protetto con le secrezioni o essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Contatto a basso rischio

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

RIFERIMENTI :

1. Sito CNS del 09-02-2022 aggiornata al DGPRES-DGPRES-P 0009498 del 04-02-2022 :
<https://www.centronazionalesangue.it/covid-19/>
2. Linee di indirizzo nazionali per la sicurezza della donazione, rivolte ai donatori di sangue ed emocomponenti e al personale pubblico ed associativo addetto all'attività di raccolta - Febbraio 2022
3. Circolare CNS 0000069 del 03-01-2022 aggiornata al DGPRES-DGPRES-P 0060136 del 30-12-2021
4. Ministero della Salute Covid-19 – Viaggiatori:
<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>